



## Myo Munchee BEBE

### 6 - 18 Monate

Dieser Munchee ist für alle Babys im Alter von 6-18 Monaten geeignet.

Ist Ihr Baby ungefähr 18 Monate alt, empfiehlt es sich, mit dem Munchee Bebe zu starten und nach 6 Monaten mit dem MyoMunchee Mini weiter zu arbeiten.



## Myo Munchee MINI

### 18 Monate - 4 Jahre

Dieser Munchee ist für Kinder ab dem 18. Lebensmonat geeignet.

Möglicherweise können auch noch 5 jährige Kinder den Myo Munchee Mini verwenden, wenn folgende Punkte zutreffen:

- Zahnengstand
- restriktives Lippen- oder Zungenband
- Mundatmung
- Ablehnendes oder wählerisches Ess-Verhalten



## Myo Munchee JUNIOR

### 4 - 8 Jahre

Dieser Munchee ist für Kinder von 4 bis 8 Jahren geeignet. Auch für 9 jährige Kinder kann der Myo Munchee Junior die richtige Größe sein. Ein oder mehrere der folgenden Punkte können dafür zutreffend sein:

- Mundatmung
- geringer Muskeltonus im Gesicht
- Zahnengstand
- restriktives Lippen- oder Zungenband.



## Myo Munchee TWEEN

### 8 - 14 Jahre & Erwachsene mit engem Kiefer

Dieser Munchee wurde für Kinder ab dem 8. Lebensjahr entworfen. Die Auflagefläche für die Molaren (=große Backenzähne) kann entfernt werden, (wenn die 12-Jahres Molaren noch nicht durchgebrochen sind). Dies ist möglicherweise auch die passende Größe für ältere Teenager, welche

- ein enges Kiefer haben
- unter schwacher Gesichtsmuskulatur
- Mundatmung
- fehlender Zungenruhelage
- unter einem restriktiven Lippen- oder Zungenband leiden/litten.

Der Übergang zur Erwachsenen Größe erfolgt meistens im Alter zwischen 12 und 14 Jahren.



## Myo Munchee ADULT

### Ab 14 Jahren+

Passt für die meisten Erwachsenen und häufig auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr mit einem Eckzahnabstand von 35-40mm) (siehe MyoMunchee Tween).

Bitte beachten Sie die Weiten-Angaben unten, um die Größe zu bestätigen.

Hat Ihr Kind besondere Bedürfnisse?

Bei Kindern mit besonderen bedürfnissen wird eine kleinere Myo Munchee Größe empfohlen, um das Einführen und die Handhabung zu erleichtern. Sehr häufig werden die folgenden zwei Punkte bei dieser Kinder- oder Erwachsenenengruppe beobachtet und daher ein kleinerer Myo Munchee angeboten:

1. Geringer oraler Tonus in Lippen, Zunge oder Wangen, fällt häufig als Speicheln oder Sabbern auf.
2. Häufig kann keine Zungenruhelage am Gaumen oder ein korrektes Schluckmuster beobachtet werden.



## MyoMunchee Größenleitfaden anhand des Eckzahnabstands

BEBE	MINI	JUNIOR	TWEEN	ADULT
Nur in Verbindung mit einer Practioner Beratung!	N/A Altersleitfaden beachten	30 - 35mm	33 - 37mm	35 - 40mm